







Empfohlene Pflanzenschutzmittel im Verarbeitungsgemüse für die Saison 2026

IPS Buschbohnenanbau

In Zusammenarbeit der SCFA (Swiss Convenience Food Association) und des VSGP (Verband Schweizer Gemüseproduzenten)

Problem	 Auflaufen	 Bildung der Laubblätter	 Bildung der Blütenknospen	Bemerkungen
Schnecken	Schneckenkörner (Metaldehyd)			Nur Randpartien und betroffene Stellen behandeln. Aufwandmengen gemäss Firmenangaben
Unkraut im Vorauflauf	Cargon S, Clomastar 0.25 (Clomazone) + Successor 600 2.0 (Pethoxamid) Colzaphen, Rodino ready 3.0 (Pethoxamid + Clomazone) + Spectrum Loper, Mazil, 1.2 (Dimethenamid-P)			Falls bei der Saat feuchte Bodenbedingungen herrschen. Nachverunkrautung überwachen und evtl. Nachauflaufmittel einsetzen. Anwendung bis max. 2 Tage nach der Saat
Unkraut im Nachauflauf		Bolero 0.8 -1.0 (Imazamox) Bolero 0.6 – 1.0 Mit oder ohne <i>Bentazon Produkte</i> (Imazamox + Bentazon)		Bei Splittbehandlung 2 x 0.6 - 0.8 anwenden. Gute Amarantwirkung Untere Dosierung bei Splittbehandlung. 2. Splitt bei Neuauflauf insofern nötig.
Gräser, Hirschen	Focus Ultra, Ruga 1.0 - 2.0 (Cycloxydim) Select 0.5-1.0 (Clethodim)+ Herbizidöl 0.5 l			Ab Zweiblattstadium der Hirschen. Auch Teilflächenbehandlung möglich. Wartefrist: 4 Wochen Select: Letzte Behandlung vor der Blüte.

Rückseite beachten

Problem	 Bildung der Laubblätter	 Bildung der Blütenknospen	 Beginn Blüte	 Fruchtentwicklung	Bemerkungen
Botrytis, Sclerotinia	In mastigen Beständen	Fezan, Tebuconazole Omya 1.0 (Tebuconazole)			Nur in frohwüchsigen Beständen zur Erhöhung der Standfestigkeit einsetzen. Wartefrist: 3 Wochen
	1.Behandlung	Switch, Avatar 0.8 (Fludioxonil, Cyprodinil) Espiro, Papyrus, Pyrus 400 SC 2.0 (Pyrimethanil) Moon Sensation 0.8 (Trifloxystrobin +Fluopyram)	Moon Privilege 0.5 (Fluopyram)		Maximal 2 Behandlungen pro Kultur. Wartefristen: 2 Wochen
	Falls nur 1 Behandlung vorgesehen				Wartefrist: 7 Tage Maximal 2 Behandlungen pro Kultur.
	2. Behandlung: Bei sehr hohem Sclerotinia- druck oder notfalls als zweite Moonbehand- lung	Moon Privilege 0.5 (Fluopyram)			Maximal 2 Behandlungen pro Kultur Unsere Empfehlung: Letzte Behandlung in die Vollblüte Wartefrist: 7 Tage
Baumwollkap- seleule	Notfallzulassung abwarten	Coragen 0.125 (Chlorantraniliprole)			Max. 2 mal pro Kultur und maximal alle 2 Jahre auf derselben Parzelle anwenden. Wartefrist: 3 Tage