



Empfohlene Pflanzenschutzmittel im Verarbeitungsgemüse für die Saison 2026

Drescherbsenanbau

In Zusammenarbeit der SCFA (Swiss Convenience Food Association) und des VSGP (Verband Schweizer Gemüseproduzenten)

Problem		 10 Blattbildung	 11 Rankenbildung	 Blattentwicklung Längenwachstum	 Entwicklung Blütenanlagen	 Blüte	Bemerkungen <small>! Im IPS-Anbau nicht zugelassen</small>
Allgemeine Empfehlung für Bentazon Produkte		! Bentazon Produkte Basagran SG, Efficane SG, Kusak SG, Pedian SG 0.8-1.1 (Bentazon)					Zum Schutz von Grundwasser nicht mehr als 0.96 kg des Wirkstoffs Bentazon = 1.1 kg /ha der Bentazon Produkte auf derselben Parzelle innerhalb von 2 Jahren anwenden
Einjährige Unkräuter und Gräser		Bandur, Baso, Chanon, Dacthal SC, Laguna 1.0 + ! Bentazon Produkte (Aclonifen+ Bentazon)					Bei heissen Temperaturen und starkem Lichteinfluss sollte die Aufwandmenge von Bandur wegen Verbrennungsgefahr auf 0.8 l/ha gesenkt werden.
		Sitradol-Tec, Pendi, Pendimethalin SA-400 SC 1.0 Hysan Aqua, Stomp Aqua, 0.9 + ! Bentazon Produkte (Pendimethalin+ Bentazon)					
		Bolero 0.6 - 0.8 (Imazamox)					Die Dosierung von 0.8 l/ha bei Bolero sollte nicht überschritten werden. Grund: Unkontrollierte Abreife
Wurzelunkräuter		Bolero 0.6 - 0.8 ! MCPB , Divopan, Trifolin 2.0 (Imazamox + MCPB)					Falls nötig kann die Behandlung bis kurz vor der Blüte wiederholt werden.

Rückseite beachten

Problem	 Blattbildung	 Rankenbildung	 Blattentwicklung Längenwachstum	 Entwicklung Blütenanlagen	 Blüte	Bemerkungen ! Im IPS-Anbau nicht zugelassen
Gräser Hirsen			Agil, Propaq 0.75 - 1.25 (Propaquizafop) Targa Super 0.75-1.25 (Quizalofop-P-ethyl) Focus Ultra, Ruga 1.0 - 2.0 (Cycloxydim)	Select 0.5 + Herbizidöl 0.5 l		Ab Zweiblattstadium der Hirsen auch Teilflächenbehandlung möglich. Wartefristen: 4 Wochen Select: Nur bis Stadium 19 (mehrere Laubblätter und Ranken entfaltet) einsetzen
Erbsen- blattrandkäfer		! Decis Protech 0.5 (Deltamethrin) Karate Zeon, Techno 10 CS, LambdaStar 0.1 (Lambda-Cyhalothrin)		Sonderbewilligung beantragen		Max. 2 Behandlungen/Jahr Wartefrist: 2 Wochen Wartefrist: 1 Woche Max. 2 Behandlungen/Jahr
Brennflecken- krankheit	Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbar werden der ersten Symptome	Fezan, Folicur, Horizont, Tebuconazole Omya 1.0 (Tebuconazole) Switch 1.0 (Cyprodinil Fludioxonil) Priori Top 1.0 (Azoxystrobin, Difenoconazol) Dagonis, Taifen 2.0 (Fluxapyroxad, Difenoconazol) <i>Diese Produkte kombinieren mit Schwefel (Sulfix 2-5 l, Sulfo S 3-5 l, Sufrostar 3-5 l)</i>				Max. 2 Behandlungen Wartefrist: 3 Wochen Max. 2 Behandlungen Wartefrist: 14 Tage Max. 3 Behandlungen Wartefrist: 7 Tage Max. 1 Behandlung Wartefrist: 7 Tage
Blattläuse		Teppeki 0.14 + Break-Thru 0,2 l/ha (Flonicamid) Pirimor, Pirimicarb 0.15 (Pirimicarb)				Max. 1 Behandlung/Jahr WF. 2 W. Max. 2 Behandlung/Jahr WF. 1 W.
Kartoffelkäfer		Gazelle SG, Oryx Pro, Pistol, Mospilan SG 0.1 (Acetamiprid)				Max. 1 Behandlung/Jahr Wartefrist: 2 Wochen
Erbsenwickler		!Aligator, !Deltastar 0.3, !Decis Protech, 0.5, (Deltamethrin) !		!IPS: Sonderbewilligung beantragen		Max. 2 Behandlung/Jahr Wartefrist: 2 Wochen