






Empfohlene Pflanzenschutzmittel im Verarbeitungsgemüse für die Saison 2026

IPS Drescherbsenanbau

In Zusammenarbeit der SCFA (Swiss Convenience Food Association) und des VSGP (Verband Schweizer Gemüseproduzenten)

Problem		 10 Blattbildung	 11 Rankenbildung	 Blattentwicklung Längenwachstum	 Entwicklung Blütenanlagen	 Blüte	Bemerkungen
Einjährige Unkräuter und Gräser Wirkstoffkombinationen in diesem Bereich sind möglich. Untere Dosierungen anwenden.	Bandur, Baso, Chanon, Dacthal SC, Laguna 1.0 (Aclonifen)						Bei heissen Temperaturen und starkem Lichteinfluss sollte die Aufwandmenge von Bandur wegen Verbrennungsgefahr auf 0.8 l/ha gesenkt werden.
	Sitradol-Tec, Pendi 1.0 Hysan Aqua, Stomp Aqua, 0.9 (Pendimethalin)						
	Bolero 0.6 - 0.8 (Imazamox)						Die Dosierung von 0.8 l/ha sollte nicht überschritten werden. Grund: Unkontrollierte Abreife

Rückseite beachten

Problem	Blattbildung 	Rankenbildung 	Blattentwicklung Längenwachstum 	Entwicklung Blütenanlagen 	Blüte 	Bemerkungen
Gräser Hirsen			Agil, Propaq 0.75 - 1.25 (Propaquizafop) Targa Super 0.75-1.25 (Quizalofop-P-ethyl) Focus Ultra, Ruga 1.0 - 2.0 (Cycloxydim)			Ab Zweiblattstadium der Hirszen auch Teilflächenbehandlung möglich. Wartefristen: 4 Wochen Select: Nur bis Stadium 19 (mehrere Laubblätter und Ranken entfaltet) einsetzen
Erbsen-blattrandkäfer		Karate Zeon, Techno 10 CS, Lambdastar 0.1 (Lambda-Cyhalothrin)		Sonderbewilligung beantragen		Max. 2 Behandlungen/Jahr Wartefrist: 2 Wochen Wartefrist: 1 Woche Max. 2 Behandlungen/Jahr
Brennflecken-krankheit	Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbar werden der ersten Symptome	Fezan, Folicur, Horizont, Tebuconazole Omya 1.0 (Tebuconazole) Switch 1.0 (Cyprodinil Fludioxonil) Priori Top 1.0 (Azoxyystrobin, Difenoconazol) Dagonis, Taifen 2.0 (Fluxapyroxad, Difenoconazol) <i>Diese Produkte kombinieren mit Schwefel (Sulfix 2-5 l, Sulfo S 3-5 l, Sufrostar 3-5 l)</i>				Max. 2 Behandlungen Wartefrist: 3 Wochen Max. 2 Behandlungen Wartefrist: 14 Tage Max. 3 Behandlungen Wartefrist: 7 Tage Max. 1 Behandlung Wartefrist: 7 Tage
Blattläuse		Teppeki 0.14 + Break-Thru 0,2 l/ha (Flonicamid) Pirimor, Pirimicarb 0.15 (Pirimicarb)				Max. 1 Behandlung/Jahr WF. 2 W. Max. 2 Behandlung/Jahr WF. 1 W.
Kartoffelkäfer		Gazelle SG, Oryx Pro, Pistol, Mospilan SG 0.1 (Acetamiprid)				Max. 1 Behandlung/Jahr Wartefrist: 2 Wochen
Erbsenwickler		Aligator, Deltastar 0.3, Decis Protech, 0.5, (Deltamethrin)	IPS: Sonderbewilligung beantragen			Max. 2 Behandlung/Jahr Wartefrist: 2 Wochen